

# Anti-Mouse Osteocalcin polyclonal, Rabbit [mOC(1-20)]

Code No. M173

Size : 0.1 mg Rabbit Ig

\* 2 years from date of receipt under proper storage conditions.

## Source :

Rabbit polyclonal antibody raised against N - terminal peptide of mouse osteocalcin conjugated with KLH.

## Purification :

Rabbit serum IgG was purified by affinity column chromatography, dissolved in 10 mM PBS, pH 7.4, containing 1.0% bovine serum albumin, and then lyophilized.

The lyophilized antibody does not contain preservative.

**Form :** Lyophilized

## Reconstitution :

Dissolve the lyophilized antibody in 50  $\mu$ l of distilled water (final concentration: 2.0 mg/ml). This solution can be used as a stock solution. If dilution is necessary for your application, dilute the stock solution with the following Dilution solution just prior to use. When the entire amount of antibody is to be used over a short time period, it may be dissolved directly in 500  $\mu$ l or more of the Dilution solution.

Note (1) : Be sure to store the antibody at a minimum concentration of 2.0 mg/ml. A lower antibody concentration may result in decreased stability.

Note (2) : Reconstituted antibody solution should contain 0.1% sodium azide as a preservative when stored at 4°C.

## Dilution solution :

10 mM PBS (pH 7.4)  
1.0% BSA  
(0.1% NaN<sub>3</sub>) \*

\* When stored at 4°C, 0.1% sodium azide should be added as a preservative.

## Specificity :

- This antibody recognizes intercellular N - terminal amino acid sequence of mouse osteocalcin (1 - 20) [YLGAS VPSPD PLEPT REQCE].
- This antibody reacts with mouse osteocalcin.
- This antibody does not cross react with rat osteocalcin.

## Working concentration :

1 - 2  $\mu$ g/ml (For immunohistochemical staining by Avidin-Biotin Complex method)

**Storage :** 4°C

This product does not contain preservative.

The stock solution (2.0 mg/ml) should be stored in aliquots at -20°C for 1 year, or should be stored at 4°C for 6 months after adding 0.1% sodium azide. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Diluted antibody should not be stored.

## Application :

Immunohistochemical detection of osteocalcin on paraffin embedded tissue sections

**Caution : This antibody can not be used for Western Blotting.**

## Amino acid sequence of osteocalcin :

|         |   | 10                  | 20                  | 30                  | 40                  | 50                  |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| HUMAN   | 1 | Y L Y Q W L G A P Y | P Y P D P L E P R R | E V C E L N P D C D | E L A D H I G F Q E | A Y R - R F Y G P V |
| BOVINE  | 1 | Y L D H W L G A P A | P Y P D P L E P K R | E V C E L N P D C D | E L A D H I G F Q E | A Y R - R F Y G P V |
| CAT     | 1 | Y L A P G L G A P A | P Y P D P L E P K R | E I C E L N P D C D | E L A D H I G F Q D | A Y R - R F Y G T V |
| CHICKEN | 1 | H Y A Q D S G V A G | A P P N P I E A Q R | E V C E L S P D C N | E L A D E L G F Q E | A Y Q R R F Y G P V |
| RABBIT  | 1 | Q L I N G Q G A P A | P Y P D P L E P K R | E V C E L N P D C D | E L A D Q Y G L Q D | A Y Q - R F Y G P V |
| RAT     | 1 | Y L N N G L G A P A | P Y P D P L E P H R | E V C E L N P N C D | E L A D H I G F Q D | A Y K R I Y G T T V |
| MOUSE   | 1 | Y L G A S V P S P D | --- P L E P T R     | E Q C E L N P A C D | E L S D Q Y G L K T | A Y K R I Y G I T I |

## Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc.

If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6973 or from our website at [www.takara-bio.com](http://www.takara-bio.com).

Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements.

All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

# Anti-Mouse Osteocalcin polyclonal, Rabbit [mOC(1-20)]

Code No. M173

Size: 0.1 mg Rabbit Ig

※ 適切に保存し、受取り後2年を目途にご使用ください。

## ●由来

マウスオステオカルシン N 末端ペプチドの KLH 複合体を免疫原として得られたウサギポリクローナル抗体。

## ●製法

ウサギ抗血清をアフィニティー精製して得た IgG 画分を、1% BSA 含有 10mM PBS (pH7.4) に溶解後、凍結乾燥。防腐剤を含みません。

## ●形状 凍結乾燥品

## ●抗体の復元

50  $\mu$ l の純水で溶解する (2.0mg/ml となる)。

これをストック溶液とし、使用時に希釈が必要な場合は下記の希釈液を用いる。全量を使い切る場合は、500  $\mu$ l 以上の希釈液で直接溶解することもできる。

(注 1) 抗体濃度が低いと保存安定性が下がる可能性があるため、保存は必ず上記のストック溶液 (2.0mg/ml) で行ってください。

(注 2) 復元した抗体溶液を 4°C で保存する場合は、防腐剤として 0.1% アジ化ナトリウムを添加してください。

## ●希釈液

10 mM PBS (pH7.4)  
1.0% ウシ血清アルブミン  
(0.1% アジ化ナトリウム)\*

\* : 4°C で保存する場合は防腐剤として加えてください。

## ●特異性

- ・マウスオステオカルシン N 末端アミノ酸配列 (1-20) [YL GAS VPSPD PLEPTREQCE] をエピトープとする。
- ・マウスオステオカルシンと反応する。
- ・ラット抗原とは交差反応しない。

## ●使用抗体濃度

免疫組織染色 : 1 ~ 2  $\mu$ g/ml (Avidin-Biotin Complex 法)

## ●保存 4°C

本製品は防腐剤を含んでいません。復元後のストック溶液 (2.0 mg/ml) は必要に応じて分注し -20°C 保存で 1 年、もしくは防腐剤 (0.1% アジ化ナトリウム等) を加えて 4°C 保存で 6 ヶ月を目途にご使用ください。凍結融解の繰り返しは避けてください。また、希釈後の保存はなるべく避けてください。

## ●用途

パラフィン包埋切片の免疫組織染色

**注意：ウェスタンブロッティングアッセイには使用できません。**

## ●各動物オステオカルシンの一次構造

|         | 10                      | 20                  | 30                  | 40                  | 50                  |
|---------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| HUMAN   | 1 Y L Y Q W L G A P A Y | P Y P D P L E P R R | E Y C E L N P D C D | E L A D H I G F Q E | A Y R - R F Y G P V |
| BOVINE  | 1 Y L D H W L G A P A   | P Y P D P L E P K R | E Y C E L N P D C D | E L A D H I G F Q E | A Y R - R F Y G P V |
| CAT     | 1 Y L A P G L G A P A   | P Y P D P L E P K R | E I C E L N P D C D | E L A D H I G F Q D | A Y R - R F Y G T V |
| CHICKEN | 1 H Y A Q D S G Y A G   | A P P N P I E A Q R | E Y C E L S P D C N | E L A D E L G F Q E | A Y Q R R F Y G P V |
| RABBIT  | 1 Q L I N G Q G A P A   | P Y P D P L E P K R | E Y C E L N P D C D | E L A D Q Y G L Q D | A Y Q - R F Y G P V |
| RAT     | 1 Y L N N G L G A P A   | P Y P D P L E P H R | E Y C E L N P N C D | E L A D H I G F Q D | A Y K R I Y G T T V |
| MOUSE   | 1 Y L G A S V P S P D   | --- P L E P T R     | E Q C E L N P A C D | E L S D Q Y G L K T | A Y K R I Y G I T I |

## ●注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。  
タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。  
本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v201902