

Anti-Rat Bone Specific Alkaline Phosphatase, Polyclonal

Code No. M190 **Size: 0.1 mg Rabbit IgG**

* 2 years from date of receipt under proper storage conditions.

Source:

Rabbit polyclonal antibody raised against the conjugate of KLH and the peptide (20 - 49) [PEKEKDPKYWRDQAQETLKYALELQKLNTN], which shows high homology with human and rat Bone Specific Alkaline Phosphatase.

Purification:

Rabbit serum IgG was purified by affinity column chromatography, dissolved in 10 mM PBS, pH 7.4, containing 1.0% bovine serum albumin, and then lyophilized.

The lyophilized antibody does not contain preservative.

Form: Lyophilized

Reconstitution:

Dissolve the lyophilized antibody in 50 μ l of distilled water (final concentration: 2.0 mg/ml). This solution can be used as a stock solution. If dilution is necessary for your application, dilute the stock solution with the following Dilution solution just prior to use. When the entire amount of antibody is to be used over a short time period, it may be dissolved directly in 500 μ l or more of the Dilution solution.

Note (1) : Be sure to store the antibody at a minimum concentration of 2.0 mg/ml. A lower antibody concentration may result in decreased stability.

Note (2) : Reconstituted antibody solution should contain 0.1% sodium azide as a preservative when stored at 4°C.

Dilution solution:

10 mM PBS (pH 7.4)
1.0% BSA
(0.1% NaN₃) *

* When stored at 4°C, 0.1% sodium azide should be added as a preservative.

Specificity:

This antibody specifically reacts with rat Bone Specific Alkaline Phosphatase.

Cross reactivity:

- This antibody reacts with mouse antigen.
- This antibody reacts faintly with human antigen.

Working concentration:

- 10 - 20 μ g/ml (For immunohistochemical staining by color detection)
- 2 - 10 μ g/ml (For Western blotting by color detection)

Storage: 4°C

This product does not contain preservative.

The stock solution (2.0 mg/ml) should be stored in aliquots at -20°C for 1 year, or should be stored at 4°C for 6 months after adding 0.1% sodium azide. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Diluted antibody should not be stored.

Application:

- Detection of Bone Specific Alkaline Phosphatase by Western blot analysis under non-reducing condition
- Immunohistochemical detection on paraffin embedded tissue sections *
 - * No need of antigen retrieval

Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc. If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6973 or from our website at www.takara-bio.com. Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements. All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

Anti-Rat Bone Specific Alkaline Phosphatase, Polyclonal

Code No. M190 Size: 0.1 mg Rabbit IgG

※ 適切に保存し、受取り後2年を目途にご使用ください。

●由来

ヒトおよびラットの骨型アルカリホスファターゼのホモロジーの高い部分ペプチド (20 - 49) [PEKEKDPKYWRDQAQETLKYALELQKLNTN]-KLH 複合体を免疫原として得られたウサギポリクローナル抗体

●製法

ウサギ抗血清をアフィニティー精製して得た IgG 画分を、1% BSA 含有 10mM PBS (pH7.4) に溶解後、凍結乾燥。防腐剤を含みません。

●形状 凍結乾燥品

●抗体の復元

50 μ l の純水で溶解する (2.0 mg/ml とする)。これをストック溶液とし、使用時に希釈が必要な場合は下記の希釈液を用いる。全量を使い切る場合は、500 μ l 以上の希釈液で直接溶解することもできる。

(注 1) 抗体濃度が低いと保存安定性が下がる可能性があるため、保存は必ず上記のストック溶液 (2.0 mg/ml) で行ってください。

(注 2) 復元した抗体溶液を 4°C で保存する場合は、防腐剤として 0.1% アジ化ナトリウムを添加してください。

●希釈液

10 mM PBS (pH 7.4)
1.0% ウシ血清アルブミン
(0.1% アジ化ナトリウム)*

* : 4°C で保存する場合は防腐剤として加えてください。

●特異性

ラット骨型アルカリホスファターゼに特異的に反応する。

●交差反応

- ・マウス抗原に反応する。
- ・ヒト抗原への反応は非常に弱い。

●使用抗体濃度

- ・免疫組織染色 (発色法) : 10 ~ 20 μ g/ml
- ・ウェスタンブロット法 (発色法) : 2 ~ 10 μ g/ml

●保存 4°C

本製品は防腐剤を含んでいません。復元後のストック溶液 (2.0 mg/ml) は必要に応じて分注し 20°C 保存で 1 年、もしくは防腐剤 (0.1% アジ化ナトリウム等) を加えて 4°C 保存で 6 ヶ月を目処にご使用ください。凍結融解の繰り返しは避けてください。また、希釈後の保存はなるべく避けてください。

●用途

- ・パラフィン包埋切片の免疫組織染色
* 抗原の賦活化は必要ない。
- ・非還元条件下でのウェスタンブロット法による骨型アルカリホスファターゼの検出

●注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。
本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v201902